




# PERIPrem جواز سفر الطفل الرضيع

لا يزال قيد العمل تم إكمال هذا الأمر



أنا أتواجد في المستشفى المناسبة في حالة جاء موعد ولادة طفلي أو أطفالي مبكراً.



## المكان المناسب للولادة

بالنسبة للأطفال الذين تتم ولادتهم قبل الأسبوع الـ 27 من الحمل وبالنسبة لولادة الأطفال التوائم الذين تتم ولادتهم قبل الأسبوع الـ 28 من الحمل أو الأطفال الذين تتم ولادتهم ويبلغ وزنهم عند الولادة أقل من 800 جرام)

لا يزال قيد العمل تم إكمال هذا الأمر



لقد حصلت على دورة الدواء الكاملة المتعلقة بالمنشطات Steroids للمساعدة في تحضير طفلي أو أطفالي للولادة المبكرة.



## المنشطات (Steroids) المعطاة أثناء الحمل

بالنسبة للأطفال الذين تتم ولادتهم قبل الأسبوع الـ 34 من الحمل)

لا يزال قيد العمل تم إكمال هذا الأمر



لقد حصلت على سلفات المغنيسيوم للمساعدة في تطوير ونمو دماغ طفلي أو أطفالي .



## سلفات المغنيسيوم الذي يتم إعطاؤها أثناء الحمل

(للأطفال الذين تتم ولادتهم قبل الأسبوع الـ 30 من الحمل)

لا يزال قيد العمل تم إكمال هذا الأمر



لقد حصلت على المعلومات حول فوائد تناول الحليب المبكر من الثدي ولقد تم اطلاعي حول كيفية استخدام تقنيات مضخة الصدر أو عصر الحليب من الثدي باستخدام اليد لمساعدتي في الحصول على حليب الثدي المبكر ليتناوله طفلي أو أطفالي قبل أو خلال ساعة من ولادتهم.



## حليب الثدي في الفترات المبكرة بعد الولادة

(للأطفال الذين تتم ولادتهم قبل الأسبوع الـ 34 من الحمل)

لا يزال قيد العمل تم إكمال هذا الأمر



بعد ولادة طفلي أو أطفالي سيساعدني الفريق المهني في الحصول على عينات الدم الإضافية من المشيمة للمساعدة في المحافظة على أطفالي وذلك قبل دقيقة واحدة على الأقل من قص الحبل السري.



## تأخير وضع الملقط على الحبل السري

(للأطفال الذين تتم ولادتهم قبل الأسبوع الـ 34 من الحمل)

لا يزال قيد العمل تم إكمال هذا الأمر



بعد ولادة طفلي أو أطفالي سيحاول الفريق المهني المحافظة على درجة حرارة أجسام أطفالي ما بين 36.5 درجة مئوية و 37.5 درجة مئوية وسيساعدني أيضاً الفريق بالإمساك بطفلي أو أطفالي وملامسة جلدي لجلد طفلي أو أطفالي فور التأكد من سلامة القيام بهذا الأمر ، وسيتم القيام بهذا الأمر بطريقة مخططة ويتم تقديم ذلك لي لي بطريقة مخطط لها ومساعدة وداعمة .



## العناية الحرارية

(للأطفال الذين تتم ولادتهم قبل الأسبوع الـ 34 من الحمل)

لا يزال قيد العمل تم إكمال هذا الأمر



إذا احتاج الطفل الحصول على الأنبوب وجهاز التهوية لمساعدته على التنفس فسيقوم فريق رعاية الأطفال حديثي الولادة بحماية رتي طفلي أو أطفالي عن طريق استخدام الإعدادات الخاصة المتعلقة بجهاز التهوية.



## رعاية الجهاز التنفسي

(للأطفال الذين تتم ولادتهم قبل الأسبوع الـ 34 من الحمل والذين قد يحتاجون الحصول عليه)

لا يزال قيد العمل تم إكمال هذا الأمر



لقد تم إعطاء طفلي أو أطفالي الكافيين لحماية دماغه ولمساعدته على التنفس.



## الكافيين

(للأطفال الذين تتم ولادتهم قبل الأسبوع الـ 30 من الحمل وبعض الأطفال الذين تتم ولادتهم قبل الأسبوع الـ 34 من الحمل أو الأطفال الذين تتم ولادتهم ويقل وزنهم عند الولادة عن 1500 غرام)

لا يزال قيد العمل تم إكمال هذا الأمر



لقد تم إعطاء طفلي أو أطفالي الدواء المحتوي على البيروبيوتيك probiotic المحتوي على البكتيريا المفيدة للجسم في اليوم الأول من ولادته للمساعدة في حماية أمعائه.



## Probiotics (المواد المساعدة الحيوية)

(للأطفال الذين تتم ولادتهم قبل الأسبوع الـ 32 من الحمل أو الأطفال الذين تتم ولادتهم ويقل وزنهم عند الولادة عن 1500 غرام)

لا يزال قيد العمل تم إكمال هذا الأمر



لقد تم إعطاء طفلي أو أطفالي عقار الهيدروكورتيزون hydrocortisone في اليوم الأول من ولادته لمساعدة رتيه وذلك بسبب ولادته مبكرة جداً.



## المعالجة الوقائية المحتوية على عقار الهيدروكورتيزون Hydrocortisone

(للأطفال الذين تتم ولادتهم قبل الأسبوع الـ 28 من الحمل)